

SEGUIMIENTO ESTRUCTURA POBLACIONAL Piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*): 8 de mayo de 2026

El piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*) es una de las plagas que más preocupa al sector citrícola en la Comunitat Valenciana ya que deprecia la corteza del fruto y, al tener varias generaciones al año, se reproduce de manera exponencial a lo largo de la campaña.

El momento de aparición de las larvas de la primera generación del año es el óptimo para la realización de un tratamiento fitosanitario y este momento es fácilmente predecible si atendemos a tres factores: la evolución de los estadios del piojo rojo de California en una parcela, el número de machos de piojo rojo de California capturados en esa misma parcela y el promedio de las Integrales Térmicas para esta especie de los municipios más cercanos.

El número de capturas de machos de esta especie nos ayudará a detectar el momento del vuelo que precede a una próxima generación de individuos inmaduros sensibles a plaguicidas y el tiempo transcurrido entre este vuelo y la siguiente generación dependerá de la temperatura, y por tanto, de la evolución de la Integral Térmica.

Se ha dividido la superficie cítrica de la Comunitat Valenciana en 5 agrupaciones (1 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Valencia y 1 en la provincia de Alicante), y de cada una de ellas se representa la siguiente información:

1- La evolución de los porcentajes de los estadios del piojo rojo de California, tomando como muestra una parcela situada dentro de la agrupación.

2- Una gráfica que representa el promedio del número de machos de piojo rojo de California capturados en 7 días en la parcela de seguimiento de estadios.

3- La Integral térmica para el piojo rojo de California obtenida como promedio de las obtenidas en las Estaciones Agroclimáticas más cercanas a la parcela de seguimiento de estadios. Como referencia se considera que el máximo de formas sensibles se alcanza con una integral térmica de unos 500°D aproximadamente, el cual suele coincidir con un porcentaje elevado de formas sensibles, en torno al 60–70%, considerando principalmente N1 y, en menor medida, N2.

La Integral Térmica indica el número de grados acumulados desde el 1 de enero del año en vigor, que superen la temperatura umbral de desarrollo (para *Aonidiella aurantii* = 11,7 °C); se expresa como grados-día, los cuales se obtienen como la diferencia entre la temperatura media y la temperatura umbral siempre que ésta última se supere y siendo el valor cero cuando la temperatura media sea menor que la umbral. Los datos de temperaturas e integral térmica acumulable de las Estaciones Agroclimáticas son proporcionados por el Servicio de Tecnología del Riego del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Adicionalmente a los tratamientos químicos, se recomienda la suelta del parasitoide *Aphytis melinus* cuando predominen las hembras jóvenes o H1.


Resumen de las observaciones hasta la fecha:

En el sur de la provincia de Alicante las formas adultas son mayoritarias, en la provincia de Valencia las formas inmaduras sensibles a tratamientos predominan en el sur mientras que en el norte son ligeramente superadas por las formas adultas, finalmente en la provincia de Castellón las formas adultas no sensibles son claramente mayoritarias.


La comparación de la integral térmica respecto al año 2025 y la media de los últimos 5 años, muestra en general valores similares en toda la Comunitat.

Comarca: La Plana Baixa (Castellón)


Evolución de estadios de *Aonidiella aurantii*: Borriana



Nº de capturas de machos de *Aonidiella aurantii*: Borriana (por día)




Grados día acumulados: Castelló Benadresa, Nules y Vila-real (valor umbral: 11,7°C)




Comarca: L'Horta Nord (Valencia)


Evolución de estadios de *Aonidiella aurantii*: Foios



Nº de capturas de machos de *Aonidiella aurantii*: Foios (por día)




Grados día acumulados: Bétera, Moncada y Sagunt (valor umbral: 11,7°C)




Comarca: La Ribera Alta (Valencia)


Evolución de estadios de *Aonidiella aurantii*: Algemesí



Nº de capturas de machos de *Aonidiella aurantii*: Algemesí (por día)




Grados día acumulados: Algemesí, Benifaió y Polinyà de Xúquer (valor umbral: 11,7°C)




Comarca: La Safor (Valencia)


Evolución de estadios de *Aonidiella aurantii*: Oliva



Nº de capturas de machos de *Aonidiella aurantii*: Oliva (por día)




Grados día acumulados: Gandia, Ondara y Villalonga (valor umbral: 11,7°C)




Comarca: El Bajo Vinalopó (Alicante)

Evolución de estadios de *Aonidiella aurantii*: Elx



Nº de capturas de machos de *Aonidiella aurantii*: Elx (por día)



Grados día acumulados: Catral, Crevillent y Elx (valor umbral: 11,7°C)

